

COMPOSICION GARANTIZADA:

Ingredientes Activos:

Esporas de *Glomus spp* 22,500 propágulos/g de producto*

Ingredientes Aditivos: :c.s.p. 1 Kilo

* Análisis garantizado en enmienda del suelo 6,6% como *Glomus intraradices*, *Glomus mosseae*, *Glomus aggregatum*, *Glomus etunicatum* (5625 propágulos/g de cada uno) y 93.4% inertes totales (Arcilla)

MODO DE ACCIÓN:

EndoMaxx es un polvo mojable que contiene propágulos vivos de múltiples especies de hongos micorrícicos arbusculares que colonizan la rizosfera de las plantas de man era simbiótica. Los hongos micorrícicos se expanden más allá de las raíces de las plantas o de la región de la rizosfera del suelo para adquirir nutrientes y agua.

CULTIVOS:

Rosas

TIPO DE FORMULACION:

POLVO MOJABLE - WP

MECANISMO DE ACCIÓN:

Los hongos micorrícicos arbusculares forman asociaciones simbióticas con raíces de los cultivos y mejoran el vigor de la planta al aumentar la capacidad del sistema radicular para absorber eficientemente el agua y los nutrientes en condiciones ambientales variables a lo largo de todo el ciclo de cultivo.

OBJETIVOS BIOLÓGICOS

Mejorar el vigor de la planta al aumentar la capacidad del sistema radicular para absorber eficientemente el agua

MODO Y EQUIPO DE APLICACIÓN:

Aplicar **EndoMaxx** al suelo en drench de forma manual con regadera, dirigiendo la aplicación a la base de la planta, sobre la zona de radicular. **EndoMaxx** puede ser aplicado en cultivos recién sembrados, trasplantados y/o establecidos.

En rosa usar equipos de aplicación en drench utilizando el equivalente a 50 litros de la mezcla por cama. Mezclar bien para dispersar completamente el producto. Una vez dispersado y suspendido, se requiere una agitación continua (mecánica o hidráulica). Evite el almacenamiento de soluciones de aplicación durante períodos más de 24 horas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Durante el manejo, aplicación y lavado del equipo de aplicación, utilice equipo de protección completo: sombrero, gafas protectoras, mascarilla, overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y de protección después de cada jornada. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo con el producto.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

“No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos”.

COMPATIBILIDAD:

Los datos de compatibilidad y rendimiento de **EndoMaxx** con otros productos agrícolas son limitados.

No mezcle **EndoMaxx** con otros productos a menos que se haya verificado su compatibilidad. Si está pensando en mezclar **EndoMaxx** con otros productos, realice antes una prueba de compatibilidad antes de mezclar un tanque entero.

FITOTOXICIDA

No es fitotóxico a los cultivos para los cuales se recomienda, al igual que las dosis y frecuencias de aplicación dadas en la etiqueta

TOXICOLOGÍA:

DL₅₀ Oral Aguda: No determinado

DL₅₀ Dermal Aguda: No determinado

Categoría toxicológica: No determinado

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga el producto en contacto con otros insumos como fertilizantes, semillas, etc. Almacene y transporte este producto bajo llave en lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor.

Conserve el producto en su envase original, etiquetado, con su panfleto y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

PERIODO DE CARENCIA Y PERIODO DE REENTRADA:

FICHA TÉCNICA

PAÍS	CULTIVO	*PC DIAS	**PR HORAS
Colombia Endomaxx	Rosa (Rosa sp)	N.A	N.A

* Periodo de carencia en días

** Periodo de Reentrada en Horas

N.A No Aplica

Anexos:

RECOMENDACIONES DE USO - REGISTROS

PAÍS	MARCA	CULTIVO	DOSIS
Colombia R.V. 12742	Endomaxx	Rosa (Rosa sp)	Plantas jóvenes: 5.0 – 10 g/ha Plantas adultas: 5.0 - 20 g/ha