



FICHA TÉCNICA

COMPOSICION GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

Inpyrfluxam 60 g/L
3-(difluoromethyl)-N-[(R)-2,3-dihydro-1,1,3-trimethyl-1H-inden-4-yl]-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide de formulacion a 20 °C

Tebuconazole200 g/L
(RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol, de formulación a 20° C

Ingredientes Aditivos.....c.s.p 1 Litro

MODO DE ACCIÓN:

Es un fungicida de acción preventiva, con actividad sobre todos los estadios y reproducción de los patógenos.

CULTIVOS:

Arroz, soya, café

MODO Y EQUIPO DE APLICACIÓN:

PLANITY MAX® se recomienda la aplicación de **PLANITY MAX®** con base en los resultados del monitoreo de la enfermedad, dentro de un programa de rotación con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción, siguiendo las recomendaciones del Comité de Prevención de Resistencia a Fungicidas –FRAC y complementado con prácticas de manejo integrado de cultivo.

COMPATIBILIDAD:

Es indispensable realizar previamente un ensayo de compatibilidad cuando se desee usar **PLANITY MAX®** con otros fungicidas.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendados en esta etiqueta.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Asegúrese de que no haya daños, corrosión, fugas, etc. en el (los) contenedor (es) antes del transporte.

No la cargue, caiga, dañe el producto y asegúrese de tomar medidas para asegurar los productos cargados.

Equipar en automóvil o embarcar para el transporte con equipo de protección (guantes, anteojos, máscara, etc.) y extintor de incendios, herramientas de emergencia necesarias.

TIPO DE FORMULACION:

Suspension Concentrada - SC

MECANISMO DE ACCIÓN:

El inpyrfluxam inhibe el Complejo II de la respiración donde actúa la SDHI., y el tebuconazole que Inhibe la síntesis de Ergosterol en la membrana del hongo al inhibir de la Demetilación en el paso C14 (IBE – DMI)

TOXICOLOGÍA:

DL₅₀ Oral > 2500 mg/kg

DL₅₀ Dermico > 2000 mg/Kg.

CL₅₀ Inhalatorio >2.702 mg/L (máxima concentración alcanzable) (4h)

Categoría Toxicologica 4 Ligeramente Peligroso

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Durante el manejo, aplicación y lavado del equipo de aplicación, utilice equipo de protección completo: sombrero, gafas protectoras, mascarilla, overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y de protección después de cada jornada. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo con el producto. No tiene antídoto específico. Tratar al paciente sintomáticamente. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.



Anexos:

RECOMENDACIONES DE USO - REGISTROS

MARCA	CULTIVO	OBJETIVO BIOLÓGICO	DOSIS L/ha	P.C (Días)	LMR* (mg/kg)	P.R (Horas)
REGIÓN ANDINA	PLANITY MAX® R.N.: PL0002492025	Piricularia (<i>Magnaporthe grisea</i>)	0.7 a 0.8	30		
		Manchado del grano (<i>Helminthosporium sp</i> , <i>Sphaerulina oryzina</i> , <i>Curvularia sp</i> , <i>Sarocladium oryzae</i> , <i>Rynchosporium oryzae</i> y <i>Cercospora oryzae</i>),	0.7	30	Inpyrfluxam: 0.01 (LOQ) Tebuconazole: 1.5	4
		Soya (<i>Glycine Max</i>) (Registro en trámite)	0.5	10	Inpyrfluxam: 0.3 ** Tebuconazole: 0.15**	4
		Café (<i>Coffea arabica</i>)	0.5	75	Inpyrfluxam: 0.01 (LOQ) Tebuconazole: 0.1	2

