



**COMPOSICION GARANTIZADA:**

**Ingrediente Activo:**  
**Diniconazole-M**..... 250 g/Kg  
 [(E)-(RS)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pent-1-en-3-ol]  
**Ingredientes Aditivos:** ..... csp 1 Kg

**TIPO DE FORMULACION:**

Polvo Mojable - WP

**MODO DE ACCIÓN:**

Es un fungicida con acción protectante y curativa, con elevado efecto sistémico en las plantas.

**MECANISMO DE ACCIÓN:**

Actúa como Inhibidor de la biosíntesis del ergosterol por medio de la demetilación de C14 afectando el funcionamiento de las membranas celulares. Pertenece al grupo de los Triazoles.

FRAC G1:3

**CULTIVOS:**

Arroz

**OBJETIVO BIOLÓGICO**

Añublo: *Pyricularia oryzae*

**MODO Y EQUIPO DE APLICACIÓN:**

Por su formulación (WP), el producto puede ser aplicado en las diferentes etapas fenológicas de los cultivos.

Puede ser aplicado en forma terrestre o aérea cuando se mezcla con agua a las dosis recomendadas, es importante respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 Metros respectivamente, en relación con cuerpos de agua y núcleos de población animal y humana.

**FITOTOXICIDAD:**

No es fitotóxico a los cultivos para los cuales se recomienda, al igual que las dosis y frecuencias de aplicación dadas en la etiqueta.

**COMPATIBILIDAD:**

Compatible con la mayoría de los insumos, excepto los de reacción alcalina. No aplicar en presencia de vientos fuertes para evitar pérdidas por deriva.

**TOXICOLOGÍA:**

DL<sub>50</sub> Oral 1460 mg/kg  
 DL<sub>50</sub> Dermica >5000 mg/kg  
 CL<sub>50</sub> >5.1 mg/L 4 Horas  
 Categoría toxicológica: III Ligeramente peligroso

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los plaguicidas en contacto con otros insumos como fertilizantes, semillas, etc. Almacene y transporte este producto bajo llave en lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor.

Conserve el producto en su envase original, etiquetado, con su panfleto y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

Durante el manejo, aplicación y lavado del equipo de aplicación, utilice equipo de protección completo: sombrero, gafas protectoras, mascarilla, overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y de protección después de cada jornada. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo con el producto.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

No existe antídoto específico, aplicar tratamiento sintomático.

PERIODO DE CARENIA Y PERIODO DE REENTRADA:

FICHA TÉCNICA

PAÍS	CULTIVO	*PC DÍAS	**PR HORAS
Colombia SUMI 8 AG 25 WP	Arroz	30	4

\*Periodo de carencia en días

\*\*Periodo de Reentrada en Horas

Anexos:

RECOMENDACIONES DE USO - REGISTROS

PAÍS	MARCA	CULTIVO	OBJETIVO BIOLÓGICO	DOSIS
Colombia R.N. 2821	SUMI 8 AG 25 WP	Arroz	Añublo: ( <i>Pyricularia oryzae</i> )	0.3 kg/Ha